

PRODUCTOS NO RECOMENDADOS EN QUEMADURAS

Esta información sirve como un recurso educativo esencial para priorizar métodos de cicatrización efectivos y evitar complicaciones derivadas de una automedicación incorrecta.

FÁRMACOS TÓPICOS DESACONSEJADOS



Antibióticos de uso rutinario: No previenen infecciones en quemaduras leves y pueden causar dermatitis alérgica o resistencias bacterianas.



Corticoides Tópicos: Retrasan la cicatrización y aumentan el riesgo de infección al disminuir la respuesta inflamatoria reparadora.

ANTISÉPTICOS Y REMEDIOS QUE DAÑAN EL TEJIDO



Antisépticos Agresivos: Son citotóxicos; dañan los fibroblastos, producen dolor intenso y retrasan la curación.



Antisépticos con Color: Su pigmentación roja impide valorar correctamente la evolución, la presencia de necrosis o signos de infección.



Remedios Caseros: Contaminan la herida, atrapan el calor y favorecen la proliferación bacteriana.



Bibliografía

	PRODUCTO	RIESGO PRINCIPAL
	 POVIDONA YODADA (BETADINE)	Retrasa la epitelización en uso continuado.
	 NEOMICINA	Alta tasa de alergia cutánea en piel lesionada.
	 HIELO DIRECTO	Provoca daño térmico